

吸入薬選択表

気管支喘息

ICS		エアゾール		ロタディスク	ディスク	タービュヘイラー	吸入液	インヘラー	ツイストヘラー
デバイス名									
商品名・規格	キュパール 50・100 μ g	フルタイド 50・100 μ g	フルタイド 50・100・200 μ g	フルタイド 50・100・200 μ g	バルミコート 100・200 μ g	バルミコート 0.25・0.50mg	オルベスコ 50・100・200 μ g	アズマテックス 100・200 μ g	
製剤写真									
用法・用量	低用量	50~100 μ g/回 2回/日	50~100 μ g/回 2回/日	50~100 μ g/回 2回/日	50~100 μ g/回 2回/日	100~200 μ g/回 2回/日	0.25~0.5mg/回 1-2回/日	100~200 μ g/回 1回/日	50~100 μ g/回 2回/日
	中用量	200 μ g/回 2回/日	200 μ g/回 2回/日	200 μ g/回 2回/日	200 μ g/回 2回/日	400 μ g/回 2回/日	0.5~1.0mg/回 1-2回/日	400 μ g/回 1回/日	200 μ g/回 2回/日
	高用量	400 μ g/回 2回/日	400 μ g/回 2回/日	400 μ g/回 2回/日	400 μ g/回 2回/日	800 μ g/回 2回/日	1.0~2.0mg/回 1-2回/日	800 μ g/回 1回/日	400 μ g/回 2回/日

ICS/LABA

ICS/LABA		エアゾール		ディスク	タービュヘイラー	エリプタ
デバイス名						
商品名・規格	フルティフォーム 50 (50 μ g/5 μ g) 125 (125 μ g/5 μ g)	アドエア 50 (50 μ g/25 μ g) 125 (125 μ g/25 μ g) 250 (250 μ g/25 μ g)	アドエア 100 (100 μ g/50 μ g) 250 (250 μ g/50 μ g) 500 (500 μ g/50 μ g)	アドエア 100 (100 μ g/50 μ g) 250 (250 μ g/50 μ g) 500 (500 μ g/50 μ g)	シムビコート (160 μ g/4.5 μ g)	レルベア 100 (100 μ g/25 μ g) 200 (200 μ g/25 μ g)
製剤写真						
用量	低用量	100 μ g/10 μ g/回 2回/日	100 μ g/50 μ g/回 2回/日	100 μ g/50 μ g/回 2回/日	160 μ g/4.5 μ g/回 2回/日	100 μ g/25 μ g/回 1回/日
	中用量	250 μ g/10 μ g/回 2回/日	250 μ g/50 μ g/回 2回/日	250 μ g/50 μ g/回 2回/日	320 μ g/9 μ g/回 2回/日	100~200 μ g/25 μ g/回 1回/日
	高用量	500 μ g/20 μ g/回 2回/日	500 μ g/50 μ g/回 2回/日	500 μ g/50 μ g/回 2回/日	640 μ g/18 μ g/回 2回/日	200 μ g/25 μ g/回 1回/日

※1回噴霧量:ステロイド薬/長時間作用型 β 2刺激薬

LAMA LABA

LAMA		LABA	
デバイス名	レスピマット	ディスク	ロタディスク
商品名・規格	スピリーバ 1.25・2.5 μ g	セレベント 50 μ g	セレベント 25・50 μ g
製剤写真			
用法・用量	2.5 μ g~5 μ g/回 (2吸入/回) 1回/日	50 μ g/回 2回/日	50 μ g/回 2回/日

COPD

LAMA

LAMA		LABA		LAMA/LABA	
デバイス名	レスピマット	ハンディヘラー	ブリーズヘラー	ジェヌエア	エリプタ
商品名・規格	スピリーバ 2.5 μ g	スピリーバ 吸入用Cap 18 μ g	シープリ 吸入用Cap 50 μ g	エクリラ 4.00 μ g	エンクラッセ 62.5 μ g
製剤写真					
用法・用量	5 μ g/回 (2吸入/回) 1回/日	18 μ g/1Cap/回 1回/日	50 μ g/1Cap/回 1回/日	400 μ g/回 (1吸入/回) 2回/日	62.5 μ g/回 1回/日

LABA

LAMA/LABA

LABA		LAMA/LABA					
デバイス名	ディスク	ロタディスク	ブリーズヘラー	タービュヘイラー	ブリーズヘラー	エリプタ	レスピマット
商品名・規格	セレベント 50 μ g	セレベント 25・50 μ g	オンプレス 吸入用Cap 150 μ g	オーキシス 9 μ g	ウルティプロ 吸入用Cap (50 μ g/110 μ g)	アノーロ (62.5 μ g/25 μ g)	スピオルト 2.5 μ g
製剤写真							
用法・用量	50 μ g/回 2回/日	50 μ g/回 2回/日	150 μ g/1Cap/回 1回/日	9 μ g/回 2回/日	1Cap(50 μ g/110 μ g)/回 1回/日	62.5 μ g/25 μ g/回 1回/日	5 μ g/回 (2吸入/回) 1回/日

※長時間作用性抗コリン薬/長時間作用性 β 2刺激薬

赤色:院内・院外採用
青色:院外採用のみ