労災だより

2021 - Mar

No. 23

新型コロナワクチンについて

正しい知識を持って接種しよう！

横浜労災病院感染症部 城 裕之

諸外国に比べて遅れていた日本の新型コロナワクチン接種も、ようやく2月17日から厚労省管轄の国立病院機構、地域医療機能推進機構、労災病院から選ばれた全国100箇所の病院において、医療関係者への先行接種（臨床試験）という形で開始されました。

当院においても、2月18日から接種を開始し、既に180名の職員に対する1回目の接種が終了したところです（3月10日現在）。1回目の副反応としては、2名の発熱を除くと軽微な局所反応がほとんどであり、アナフィラキシー等の重症のアレルギー反応は認めませんでした。

今回接種したワクチンはファイザー社製のm-RNAワクチン（商品名：コミナティ筋注）ですが、-75℃の冷凍保存が必要であったり、死腔の少ない特殊な注射器が必要であったりして取り扱いには注意が必要です。今後、横浜市の医療関係者への優先接種が始まりますが、神奈川県計画では、当院を含む市内8箇所の病院が基本型接種施設（ディープフリーザー設置済）として指定され、それぞれの基本施設から連携施設へワクチンを配送することとなります。報道されているように、本ワクチンの輸入が遅れており、現時点で地域の医療関係者への接種が具体的にいつ始まるのかについては予定が立たない状況となっています。

現在、日本政府が契約を結んでいる新型コロナワクチンはファイザー社を含め3種類あります。3種類のワクチンを比較した表を作成しました。

今回、先行接種に使用したファイザー社のワクチンは、世界で初めてのm-RNAワクチンであり、3週間間隔で2回筋肉注射をすることにより高い免疫効果が得られます（有効率：95%）。一方、新しいワクチンに対して不安を感じている方も多いことと思います。

新型コロナワクチンへの理解を深めて頂くために、

表1：3種の新型コロナワクチンの比較

製造会社	製法	保管温度	年齢	接種間隔	有効率 % (95%信頼区間)	契約数
ファイザー (2月17日 接種開始)	m-RNA ワクチン	-75℃	16歳以上	21日	95.0 (90.3-97.6)	年内に 7200万人分
アストラ ゼネカ (2月5日 承認申請)	ウイルスベク ターワクチン	2~8℃	18歳以上	28日	94.1 (89.3-96.8)	3月までに 1500万人分、その後 4500万人分
モデルナ (3月5日 承認申請)	m-RNA ワクチン	-20℃	18歳以上	28日	90.0 (67.4-97.0)	6月までに 2000万人分、その後 500万人分

1) m-RNA ワクチンの原理、2) 筋注の理由、3) アナフィラキシーを含む副反応、4) 接種対象者の注意点について説明したいと思います。

1) RNA ワクチンの原理 (図1、2)

図1：ワクチンの作製方法

図2：m-RNA ワクチンの原理

mRNAワクチンの作用機序 (NIH Director's Blogより)

mRNAワクチンが効果を発揮する機序 (DOI: 10.1056/NEJMoa2034577)

従来のワクチンは弱毒生ワクチンまたは不活化ワクチンであり、いわばウイルスそのものをヒトに接種して免疫をつけていました。新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) は、その表面に突起 (スパイク) があり、これが細胞表面のレセプター (ACE2 受容体) に吸着し細胞内に侵入します。細胞内でウイルスの遺伝情報が複製・転写・翻訳されて、ウイルスの素材が合成され組み立てられることにより増殖していきます。このプロセスのなかで、**スパイクタンパクを作る設計図 (m-RNA) に着目したものが m-RNA ワクチン**です。m-RNA 自体は大変に壊れやすいので、脂 (脂質ナノ粒子) の膜で包み込み筋肉注射します。この設計図 (m-RNA) が筋肉内の免疫担当細胞により処理されて、スパイクタンパクが産生されます。この産生されたスパイクタンパクに対して中和抗体が産生されます (液性免疫)。不活化ワクチンと異なり、m-RNA ワクチンでは**細胞性免疫も誘導されることが特徴**です。以上が m-RNA ワクチンの原理であり、ウイルスそのものを接種するわけではありませんので、ワクチンにより感染することはありません。「m-RNA ワクチンがヒトの遺伝子に変化を与えるのではないか」という心配をされる方もいますが、そもそも **m-RNA 自体はヒトの細胞の核内に入りこむことはできません**。したがって、m-RNA ワクチンがヒトの

遺伝子に組み込まれることはなく、「遺伝子組み換え技術」とは全く異なるものです。

2) 筋注の理由

日本においては、諸般の事情により、ワクチン接種は主に皮下注射で行われてきました。欧米ではワクチン接種は筋肉注射で行われてきました。**筋肉注射の利点**は3つあります。①筋肉注射の方が、**免疫効果が高い**。m-RNA ワクチンは設計図のみを接種しますので、接種後できるだけ早く免疫細胞に処理される必要があります。血流の多い筋肉の方が早く免疫細胞に処理されることとなります。②筋肉注射の方が**痛くない**（痛みを感じる神経が少ない）。③筋肉注射の方が、**局所反応が少ない**。m-RNA ワクチンは局所反応が比較的強いことが知られています。

3) アナフィラキシーを含む副反応

重症のアレルギー反応（アナフィラキシー）は米国でのデータでは、20万人に一人発生しています。一般のワクチンによるアナフィラキシーの発生率は100万人に一人とされていますので、本ワクチンでは**アナフィラキシーへの注意・準備が必要**です。米国においてアナフィラキシーを発症した50名では、①死亡例はない、②女性が多い（94%）、③90%は30分以内に発症、④40人（80%）は過去にアレルギーを指摘、⑤12人（24%）は過去にアナフィラキシーを起こした、等の特徴がありました。アナフィラキシーの原因としては、m-RNA ワクチンに含まれる**PEG（ポリエチレングリコール）**が考えられています。PEGとその類似物質ポリソルベートは、界面活性剤や食品添加剤として医薬品（便秘薬、軟膏、ワクチン等）、化粧品（クリーム、歯磨き粉等）、種々の食品に含まれています。**本ワクチンによるアナフィラキシーが女性に多い理由**は、PEG、ポリソルベートに接触する機会が男性よりも多いからなのかも知れません。また、3月11日までの日本でのアナフィラキシーの報告は37件（死亡者はいない）あり、これは5000人に一人という高い発生率となります。うち半数は海外の基準ではアナフィラキシーに該当しないものですが、海外での医療従事者への接種でも同様の高いアナフィラキシー発生率が報告されています。これは医療関係者が業務のなかでPEGに接触する機会が多いことが原因として考えられます。アナフィラキシー以外の副反応を図3に示します。1回目より2回目に多い傾向を認めました。

図3：ファイザー社ワクチンによる副反応

4) 接種対象者の注意点

本ワクチン接種に際して、「接種不可（禁忌）、注意が必要、接種が可能」な接種者を図4に示しました。**薬、食物アレルギーがあっても、本ワクチンの成分以外のものに対するものであれば接種は可能**です。

ファイザー社の新型コロナワクチンを接種した後の、1回目と2回目の副反応の頻度 (CDC. COVID-19 vaccine safety update. January 27, 2021)

新型コロナはインフルエンザと比較して**致命率が高い感染症**です。インフルエンザの致命率は0.01～0.1%であるのに対して、新型コロナは2%であり80歳以上の高齢者では12.5%にも達します。また、新

型コロナは治癒後も、倦怠感、呼吸苦、胸部不快感、咳、嗅覚障害、脱毛等の後遺症で悩まされることもあります。新型コロナワクチン接種は法的には「努力義務」とされていますが、実際に接種するかどうかの判断は、接種した場合と接種しなかった場合のベネフィットとリスクを良く理解した上で各自が判断することが重要です。

図4：新型コロナワクチンの接種注意者（米国 CDC）

接種が可能	注意が必要	接種不可（禁忌）
<ul style="list-style-type: none"> ・花粉症 ・喘息 ・アレルギー性鼻炎 ・mRNAワクチンの成分以外 のものに対するアレルギー歴がある方 (薬、食べ物、ペット、虫、ラテックスなど) <p>→ アナフィラキシーをおこしたことがある人は接種後 30分 待機 それ以外の人は 15分 待機</p> <p>以下の場合には接種を考慮してよい</p> <ul style="list-style-type: none"> ・授乳中 ・妊娠中 ・免疫不全のある患者 <p>→いずれも接種後 15分 待機</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・中等度から重度の 急性期疾患のある人 ・別のワクチンや注射薬に対して 即時型アレルギー反応 (アナフィラキシーなど)を 起こしたことがある人 <p>→ ワクチン接種を取りやめるか 専門医に相談</p> <p>→ 接種する場合、接種後 30分間 経過観察</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・1回目のmRNAワクチン接種で 重度のアレルギー反応（アナ フィラキシーなど）の 出た人 ・mRNAワクチンの成分 (PEGを含む) に対して即時型アレルギー反応 があった人 ・ポリソルベートに対して 即時型アレルギー を起こしたことがある人

Based on CDC (<https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html>)

参考資料：

1) 忽那賢志：「効果は？ 安全性は？ 新型コロナワクチンについて知っておきたいこと Q&A で医師が解説」2021年1月20日 ヤフーニュース
<https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20210120-00217893/>

2) 日本感染症学会：COVID-19 ワクチンに関する提言（第2版）
2021年2月26日

https://www.kansenshio.or.jp/uploads/files/guidelines/2102_covid_vaccine_2.pdf

3) こびナビ：ワクチン Q&A 医療従事者の方へ
https://covnavi.jp/category/faq_medical/

4) 紙谷聡：「新型コロナワクチンなぜ筋肉注射なのか」？ / 2021年2月21日 ヤフーニュース
<https://news.yahoo.co.jp/byline/kamidanisatoshi/20210221-00223722>

産婦人科医師が中学校で講演しました

正しい知識を持って、自分と相手を大切にしてほしい

分娩部長 笠井絢子

横浜労災病院は横浜市が指定する産科拠点病院として、ハイリスクの妊婦や産婦人科の救急搬送困難患者を積極的に受け入れるとともに、病病・病診連携の強化や地域へ向けた教育・啓発活動にも力を入れています。その一環として、昨年度から横浜市医療局及び教育委員会との協働で、港北区内の中学生を対象とした啓発を行っています。

令和3年2月25日には、当院の産婦人科医の笠井絢子分娩部長が横浜市立高田中学校3年生の道徳の授業に登壇しました。笠井部長は、卒業を間近にした90

人の3年生に、受精や妊娠のメカニズム、母親のお腹の中での胎児の成長、この世界に生まれてきたことの尊さ、育ててくれた家族の力、妊娠・出産の素晴らしさ、自分が新しい命を育むときの心構えなどを丁寧に伝えました。そして、「正しい知識を持って、自分と相手を大切にしてほしい」と語りかけました。診療現場での出来事や自身の妊娠、出産、子育てのエピソードも交えた熱いメッセージは、これから未来に羽ばたく1人1人の心に残ったと思います。

講演を聞いた生徒は「今日のお話を聞いて、赤ちゃんとして生まれ、こうして中学生、高校生へと成長できたことに感動しました。親からもらった命を大切にこれから生きていきたいと思います。」との感想を寄せてくれました。また、企画を担当した同校養護教諭の安西先生からは「命が宿った奇跡、生まれてきた奇跡、家族への感謝など『生』について、そして将来について真剣に考えることができました。」と感謝の言葉をいただきました。

登録医予約専用電話 ☎ 045-474-8362 (直通) (受付時間 8:15 ~ 19:00)

～登録医療機関の皆様へ～当院への患者さんのご紹介は上記までご連絡下さい。

横浜労災病院

横浜市港北区小机町 3211 TEL 045-474-8111