

継続

ハンディヘラー吸入指導報告書

Ver.20180601改定

患者ID: _____

病院

科

医師

指導を受けた方:

ご本人 ご家族 その他

調剤薬局名:

担当薬剤師名:

先生

指導日:

年

月

日

FAX送信先: 横浜労災病院薬剤部

FAX: 045-474-8024 TEL: 045-474-8111

商品名: _____

用法用量: _____

★の項目が指導後も×の場合は、治療継続不可とします。

		指導前	指導後
準備		○・×	○・×
		○・×	○・×
		○・×	○・×
吸入		○・×	○・×
		○・×	○・×
	★	○・×	○・×
		○・×	○・×
		○・×	○・×
片付け		○・×	○・×
		○・×	○・×
うがい		○・×	○・×
		○・×	○・×

◆ 症状の評価 (A C T / m M R C ※使用した方に☑して下さい。) 結果 _____

◆ 残薬: _____ 吸入 (使用済みデバイス _____ 個)

◆ 副作用の出現: なし・あり (口渇・頻尿・嘔声・口腔内違和感・その他 _____)


◆ このデバイスを使用した治療は継続可能ですか。 可能・不可

⇒不可理由 (デバイス変更は一覧[HP参照]から同一用量のデバイスを選択し電話にて疑義照会してください。)

◆ 特記事項

(指導が実施できなかった場合など、トラブルや不備があればそちらも記載して下さい。)

ハンディヘラー 各部位の名称 (薬品名:スピリーバ)



ハンディヘラーのカプセル取り出し方 (薬品名:スピリーバ)

- ※ 飲み薬ではありません。
- ※ アルミシートは冷蔵庫(冷凍はさせない)で保管して下さい。

取り出し

- アルミシートを半分に切ります (A)
- アルミシートを「止める、切らない」の線まではがして (B)
1カプセル取り出します (C) (はがしすぎて、次のカプセルが見えてしまったら、そのカプセルは捨てます)




ハンディヘラーの吸入手順(患者さん用) 【薬品名:スピリーバ】

※ 飲み薬ではありません。

※ カプセル取り出し方法は1枚目(1/2)を参照。

① 薬の準備

- キャップと吸入口を開けます (A)
- カプセルを穴に入れます (B)
- 吸入口をカチッと音がするまで閉めます (C)
- 緑のボタンを強く1回のみ押して、離します (D)
(何回も押すと中のカプセルが破損するので注意)



② 息吐き

- 無理をしない程度に十分に息を吐きだします。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい。)



③ 吸入

- 吸入口を加え、深く息を吸い込みます。
(カプセルの震える音が聞こえます)



④ 息止め

- 吸入口から口を離し、5秒間息を止めます。

⑤ 息吐き

- 息をゆっくり吐き出します。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい)

⑥ 片付け

- マウスピースを乾いた清潔な布やティッシュでふき取ります。
- 使用後は吸入口を開け、中のカプセルを捨てた後
キャップを閉めます。




※もう1度吸入をする場合

⑦ うがい

- 吸入後は、必ずうがい(ガラガラ・ブクブク)を各3回します。

ハンディヘラー 各部位の名称 (薬品名:スピリーバ)



ハンディヘラーのカプセル取り出し方 (薬品名:スピリーバ)

- ※ 飲み薬ではありません。
- ※ アルミシートは冷蔵庫(冷凍はさせない)で保管して下さい。

取り出し

- アルミシートを半分に切ります (A)
- アルミシートを「止める、切らない」の線まではがして (B)
1カプセル取り出します (C) (はがしすぎて、次のカプセルが見えてしまったら、そのカプセルは捨てます)



- ・湿気に弱いため、使用直前に取り出します。
- ・カプセルがつぶれた場合は新しいものを使用します。

ハンディヘラーの吸入手順(薬剤師用)

【薬品名:スピリーバ】

- ※ 月に1度は新しい本体を支給して下さい。
- ※ カプセル取り出し方法は1枚目(1/2)を参照。

針が消耗するために交換が必要です

①薬の準備

- キャップと吸入口を開けます (A)
- カプセルを穴に入れます (B)
- 吸入口をカチッと音がするまで閉めます (C)
- 緑のボタンを強く1回のみ押して、離します (D)
(何回も押すと中のカプセルが破損するので注意)

②息吐き

- 無理をしない程度に十分に息を吐きだします。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい。)

息吐きをしないと、吸入がうまくできません。十分に息吐きができているか確認します。

③吸入

- 吸入口を加え、深く息を吸い込みます。
(カプセルの震える音が聞こえます)

正しく吸入できていれば、カプセルの震える音が聞こえ、振動を感じます

④息止め

- 吸入口から口を離し、5秒間息を止めます。

肺内への薬剤の沈着率を高めるため息止めが必要です。ただし、無理はさせないこと。

⑤息吐き

- 息をゆっくり吐き出します。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい)

キャップをする前に、吸入口を拭くように指導します。

⑥片付け

- マウスピースを乾いた清潔な布やティッシュでふき取ります。
- 使用後は吸入口を開け、中のカプセルを捨てた後キャップを閉めます。

本剤が目に入ると、抗コリン作用により視覚障害等の症状が発現する可能性があるため、吸入後のカプセルは手に取らず、直接ゴミ箱に捨てます。

※もう1度吸入をする場合

⑦うがい

- 吸入後は、必ずうがい(ガラガラ・ブクブク)を各3回します。

吸入ステロイドは口腔内カンジダや嚙声などの副作用を防止するため吸入後すぐにうがいをします。それ以外の吸入薬も統一化を図るため、うがいを行うように指導します。